

Avertissements Agricoles



GRANDES CULTURES

SRPV NORD PAS-DE-CALAIS

Bulletin N°15 du 1er août 1996

Pois de consERVE

Tordeuse

Le nombre d'individus capturés n'a cessé d'augmenter. Pour certains postes, les captures ont été considérables. A Teteghem, on a comptabilisé près de 300 tordeuses piégées en une semaine, quasiment 200 à Fréwillers et une centaine à Estaires.

Tous les secteurs sont concernés, la pression tordeuse persiste.

⇒ Restez vigilant.

Nos préconisations

Pour les pois de conserve semés tardivement, intervenir dès que le 2ème étage fructifère est au stade gousse plate puis tous les 8-10 jours avec des produits efficaces sur tordeuses (voir bulletin N°12 du 3 juillet 1996).

Pour les plus avancés, renouveler les interventions à la même cadence (8-10 jours) mais attention aux délais avant récolte (pas moins de 7 jours pour DECIS, KARATE VERT...). Reportez-vous au bulletin n° 12.

Eviter de réintervenir toujours avec la même matière active, alterner différents produits pour ne pas créer des phénomènes de résistance. Traiter le soir au moment où il fait le moins chaud pour obtenir une meilleure efficacité.

Réseau de piégeage SPV - AVRIL - BONDUELLE
LA FLANDRE - DEVULDER & GHYS

	Lieu	Captures 23-29/07	Cumul
Artois	Mouriez-62	3	14
	La Thieuloye-62	98	162
	Fréwillers-62	183	280
	Ligny-Tilloy-62	9	31
	S ^t Amand-62	55	69
Lille	Emmerin-59	0	32
-Lens	Auchy les Mines-62	9	236
Flandre Intérieure	Estaires-59-2	113	661
	Eecke-59	3	17
Flandre Maritime EST	Esquelbecq-59	2	12
	Wormhout-59	25	85
	Herzeele-59	136	390
	Teteghem-59	270	804
	Hondschoote-59	10	44
	Warhem-59	0	24
	Bergues-59	7	26
	West-Cappel-59	21	76
	Quaëdypre-59	5	25
	Socx-59-1	8	20
	Bierne-59-1	39	241
	Steene-59-1	0	55
	Drincham-59	135	342
	Rubrouck-59	95	154
	Volckerinckove-59	27	98
	St Pierre Brouck-59-1	58	252
	St Pierre Brouck-59-2	27	91
	Cappelle Brouck-59	83	196
	Bourbourg-59	80	249
	St Georges-59-2	14	197
Flandre Maritime OUEST	Gravelines-59	32	96
	Loon-Plage-59-1	25	203
	Loon-Plage-59-2	45	228
	St Omer Capelle-62	70	245
	Vieille Eglise-62	52	166
	Recques / Hem-62	102	122
	Nortleulinghem-62	0	19
	Eperlecques-62	21	314

● **Pois de conserve :**
Le vol des tordeuses continue.

● **Betterave :**
Absence de maladie foliaire.



Betterave

Noctuelles

Les noctuelles défoliatrices *Autographa gamma* sont toujours capturées en quantité importante sur nos sites de piégeage (voir graphe ci-dessous).

Rarement observés en culture de betteraves sucrières, les oeufs sont souvent nombreux en cultures légumières (betteraves potagères, salades...). Ces pontes sont issues des adultes de 1ère génération (2 générations par an) et peuvent apparaître prochainement dans les betteraves sucrières. **Il faut rester vigilant.**

Surveiller vos parcelles tout en sachant que pour le moment, les oeufs sont rares.

A noter qu'il faut 8 à 12 jours après l'apparition des oeufs pour pouvoir observer des larves.

Nos préconisations

Une intervention n'est pas justifiée tant qu' aucune larve n'est présente en parcelle : Attendre.

Maladies

Situation saine. On n'observe pas pour le moment, de maladie sur le feuillage (les conditions météo sont défavorables).

⇒ **Aucune intervention : Attendre.**

Captures d'*Autographa gamma* sur betteraves potagères à Willerval - 1996

Nbre de captures

